

## بررسی باقی مانده‌های آنتی‌بیوتیکی در گوشت مرغ و تخم مرغ مصرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران

آراسب دباغ مقدم<sup>۱</sup>، محسن بشاشتی<sup>۲\*</sup>، سید جواد حسینی شکوه<sup>۳</sup>، سید رضا هاشمی<sup>۴</sup>

۱. گروه پزشکی، اجتماعی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

۲. دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

۳. گروه بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

۴. دانش‌آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

\*نویسنده مسئول مکاتبات: mohsen.bashashati@gmail.com

(دریافت مقاله: ۹۳/۹/۲۸ پذیرش نهایی: ۹۶/۳/۱)

### چکیده

استفاده گسترده از آنتی‌بیوتیک‌ها ممکن است سبب باقی‌مانده‌های دارویی در مواد غذایی و همچنین القای واکنش‌های آلرژی‌زا در انسان گردد. علاوه بر این، مقاومت به باکتری‌های پاتوژن به‌طور مداوم در نتیجه استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها، کاهش پیدا می‌کند. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی حضور سه گروه آنتی‌بیوتیکی معمول شامل فلوروکینولون‌ها، تتراسایکلین‌ها و سولفونامیدها در گوشت مرغ و تخم مرغ مصرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران است. از ۷۰ نمونه شامل گوشت مرغ و تخم مرغ از سردخانه‌های ارتش نمونه‌برداری و با استفاده از آزمون الیزا نسبت به تعیین باقی‌مانده‌های آنتی‌بیوتیکی اقدام گردید. از ۳۵ نمونه آنالیز شده گوشت مرغ، ۳۵ (۱۰۰٪)، ۳۰ (۸۵/۷۱٪) و ۲۸ (۸۰/۰۰٪) نمونه به ترتیب آلوده به فلوروکینولون، تتراسایکلین و سولفونامید بودند. میانگین  $\pm$  خطای استاندارد سطوح باقی‌مانده‌های فلوروکینولون، تتراسایکلین و سولفونامید، به ترتیب  $۳۶/۵۲ \pm ۳/۶۱$  و  $۱۵/۳۵ \pm ۱/۶$ ،  $۷۲/۵۹ \pm ۴/۳۰$  میکروگرم در هر کیلوگرم در نمونه‌های گوشت مرغ بود. ۴ (۱۱/۴۳٪) نمونه از نمونه‌های گوشت مرغ بالاتر از حداکثر مقدار باقی‌مانده (MRL) بودند. این مطالعه نشان داد که ۴ (۱۱/۴۳٪)، ۸ (۲۲/۸۵٪) و صفر نمونه از ۳۵ نمونه تخم مرغ برای باقی‌مانده‌های فلوروکینولون، تتراسایکلین و سولفونامید مثبت می‌باشند. میانگین  $\pm$  خطای استاندارد سطوح باقی‌مانده‌های فلوروکینولون، تتراسایکلین و سولفونامید، به ترتیب  $۱/۲۳ \pm ۰/۶$ ،  $۲/۸۴ \pm ۰/۹۴$  و صفر میکروگرم در هر کیلوگرم در نمونه‌های تخم مرغ بود. این مطالعه نشان داد که بعضی از نمونه‌های گوشت مرغ و تخم مرغ مصرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران دارای باقی‌مانده آنتی‌بیوتیک می‌باشند، لذا با توجه به مخاطرات وجود باقی‌مانده‌های دارویی در مواد غذایی، پایش دائمی محصولات پروتئینی برای احراز سلامتی آن برای مصرف انسان ضروری می‌باشد.

**واژگان کلیدی:** باقی‌مانده آنتی‌بیوتیک، الیزا، حداکثر مقدار باقی‌مانده، گوشت مرغ، تخم مرغ

## مقدمه

آنتی‌بیوتیک‌ها یکی از مهم‌ترین ترکیبات گروه‌های زیست فعال و شیمی‌درمانی ساخته‌شده توسط سنتز میکروبی می‌باشند که توانایی از بین بردن و یا ممانعت از رشد میکروارگانیسم‌ها را دارند. ورود آنتی‌بیوتیک‌ها در زمینه دامپزشکی به فاصله کوتاهی پس از استفاده از آن‌ها برای درمان بیماری‌های باکتریایی در انسان آغاز گردید (Gustafson, 1993). آنتی‌بیوتیک‌ها در دام و طیور به منظور استفاده درمانی، پیشگیری دارویی و به‌عنوان محرک رشد در افزایش رشد و بهبود ضریب تبدیل غذایی استفاده می‌شوند (Donoghue, 2003) که نتیجه کاربرد این مواد دارویی در تولیدات حیوانی منجر به حضور باقی‌مانده‌های دارویی و متابولیت‌های آن‌ها در مواد غذایی می‌گردد. باقی‌مانده‌های این داروها و متابولیت‌های آن‌ها در گوشت و سایر مواد غذایی با منشأ دام و طیور اثرات مضر سمی بر روی سلامتی مصرف‌کننده دارد (Moreno-Bondi *et al.*, 2009).

در اکثر موارد اثرات بلندمدت باقی‌مانده‌های دارویی بر روی سلامتی انسان شناخته شده نیست، اما این داروها توانایی ایجاد واکنش‌های قوی آلرژیک در افراد حساس را دارند. به‌رغم طبیعت غیرسمی آنتی‌بیوتیک‌ها، بتالاکتام‌ها مسئول بیشتر واکنش‌های آلرژیک به آنتی‌بیوتیک‌ها می‌باشند (Sundlof, 1994; Dewdney *et al.*, 1991). آمینوگلیکوزیدها، سولفونامیدها و تتراسایکلین‌ها نیز سبب واکنش‌های آلرژیک می‌شوند (Paige *et al.*, 1997). بعضی از ماکرولیدها در بعضی از موارد استثنایی مسئول آسیب کبدی در نتیجه پاسخ

آلرژیک ویژه می‌باشند (Dewdney *et al.*, 1991). باین‌وجود، تنها تعداد معدودی از موارد ازدیاد حساسیت در نتیجه در معرض قرارگیری باقی‌مانده‌ها در گوشت گزارش شده است. واکنش‌های آنافیلاکسی به پنی‌سیلین متعاقب مصرف گوشت گاو و خوک شرح داده شده است (Raison-Peyron *et al.*, 2001) و در یک مورد آنافیلاکسی احتمالاً توسط باقی‌مانده استرپتومایسین ایجاد شده است (Schwartz and Sher, 1984).

آنتی‌بیوتیک‌ها می‌توانند انتشار مقاومت‌های آنتی‌بیوتیک را در باکتری‌ها تسریع کنند و متعاقب آن درمان عفونت‌های انسانی مشکل‌تر می‌گردد. استفاده گسترده از ضد میکروب‌ها برای کنترل بیماری در دام و طیور به موازات افزایش مقاومت باکتریایی در این حیوانات می‌باشد. سپس، باکتری‌های مقاوم در میان دام و طیور و یا در محیط از طریق انتشار کود کشاورزی و مواد غذایی آلوده، به انسان منتقل می‌شوند. اکثر سویه‌های *شریشیا کولای* که سبب عفونت مجاری ادراری در انسان می‌گردد، احتمالاً از منشأ گوشت آلوده بوده است (Samadpour *et al.*, 2002; Carlet *et al.*, 2012).

تخریب فلور نرمال دستگاه گوارش انسان اثر مخرب دیگر باقی‌مانده‌های دارویی در مواد غذایی انسان می‌باشد. باکتری‌هایی که معمولاً در روده زندگی می‌کنند به‌عنوان سد برای پیشگیری از ورود باکتری‌های بیماری‌زا عمل می‌کنند. آنتی‌بیوتیک‌ها سبب کاهش تعداد این باکتری‌ها می‌شوند و یا به‌صورت انتخابی

در ایران طبق مطالعاتی که انجام شده است بیشترین موارد مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها مربوط به رده‌های فلوروکینولون‌ها، سولفونامیدها و تتراسایکلین‌ها در صنعت طیور می‌باشد (Madadi *et al.*, 2014)؛ بنابراین هدف از این مطالعه تعیین فراوانی باقی‌مانده آنتی‌بیوتیک‌های فلوروکینولون‌ها، سولفونامیدها و تتراسایکلین‌ها در گوشت طیور و تخم‌مرغ مصرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) است.

### مواد و روش‌ها

#### - تعیین حجم نمونه

روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده بود، بدین صورت که از جامعه سردخانه‌های ارتش جمهوری اسلامی واقع در استان تهران ۶ سردخانه به صورت تصادفی انتخاب گردید. در داخل هر سردخانه نیز براساس تعداد کارتن‌های موجود و پس از کدبندی، تعداد ۶ نمونه گوشت یا تخم‌مرغ از کارتن‌های منتخب به صورت تصادفی نمونه‌گیری به عمل آمد.

بعضی از گونه‌های این باکتری‌ها را از بین می‌برند (Myllyniemi *et al.*, 2000).

تشکیلات بین‌المللی شناخته شده همانند سازمان بهداشت جهانی (World health organization: WHO)، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (Food and agricultural organization: FAO)، اتحادیه اروپا (European union: EU) و سازمان غذا و داروی ایالات متحده (Food and drug administration: FDA) حداکثر مقدار باقی‌مانده (Maximum residual level: MRL) و مصرف قابل قبول روزانه برای انسان و زمان پرهیز از مصرف را تعیین کرده‌اند. همراه با این مقررات، سیستم‌های نظارتی در اماکنی که این استانداردها لازم‌الاجرا است، می‌بایست حضور داشته باشند (AI-Ghamdi *et al.*, 2000). در حال حاضر و تا زمان نگارش این پژوهش، در ایران هیچ‌گونه مقرراتی در رابطه با استفاده از ضد میکروب‌ها، حداکثر مقدار باقی‌مانده در غذای با منشأ دام و طیور و نظام جامع نظارت بر باقی‌مانده‌های ضد میکروب‌ها در تولیدات حیوانی وجود ندارد.

حجم نمونه براساس فرمول زیر به شرح ذیل می‌باشد:

$$n = \frac{Z^2 p(1-p)}{d^2}$$

$$Z=1.96, p=10\% \text{ (MRL)}, d=\pm 0.10$$

$$n = \frac{1.96^2 \times 10\% \times 90\%}{0.10^2} = 35$$

باقی‌مانده آنتی‌بیوتیکی بالاتر از حداکثر مقدار باقی‌مانده (MRL) حدود ۱۰٪ در نمونه‌های گوشت طیور

باتوجه به مطالعات قبلی (Salehzadeh *et al.*, 2007; Salehzadeh *et al.*, 2006)، میزان فراوانی

**- روش اجرای آزمایش**

اندازه‌گیری باقی‌مانده آنتی‌بیوتیک‌های فلوروکینولون، تتراسایکلین و سولفونامید با استفاده از کیت‌های الیازی یوروپروکسیما (کشور هلند) مطابق دستورالعمل شرکت سازنده انجام گردید. نمونه‌ها پس از آماده‌سازی مطابق دستورالعمل کیت‌های موردنظر و طی مراحل آزمایش، به کمک دستگاه الیازا ریدر (Anthos 2020) در طول موج ۴۵۰ نانومتر مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به میزان جذب (Optical density: OD) هر چاهک به تفکیک مشخص گردید. در ابتدا میانگین جذب نوری چاهک‌های بلانک از جذب نوری چاهک‌های دارای استاندارد و نمونه کم شد. برای محاسبه میزان جذب، ابتدا جذب نوری استانداردها و نمونه‌ها تقسیم بر جذب نوری استاندارد صفر گردید و در نهایت در ۱۰۰ ضرب گردید.

مقادیر محاسبه‌شده میزان جذب برای استانداردها توسط برنامه Microsoft excel 2010 در مقابل غلظت آنتی‌بیوتیک‌های فلوروکینولون، تتراسایکلین و سولفونامید برحسب نانوگرم در میلی‌لیتر قرار داده شد و منحنی استاندارد رسم گردید. پس از قرائت میزان فلوروکینولون برحسب نانوگرم/میلی‌لیتر در نمونه‌های گوشت و تخم‌مرغ با استفاده از منحنی استاندارد، به‌منظور به دست آوردن غلظت نانوگرم/گرم (میکروگرم/کیلوگرم)، این مقدار به ترتیب در عدد ۴۰ و ۲۰ ضرب شد. در رابطه با غلظت نانوگرم/گرم (میکروگرم/کیلوگرم) تتراسایکلین‌ها در نمونه‌های گوشت و تخم‌مرغ، مقدار به‌دست‌آمده به ترتیب در عدد

گزارش شده است، لذا مقدار  $p$  در فرمول فوق ۱۰٪ در نظر گرفته شد. ایده آل این است که  $d$  برابر با ۰/۰۵ در نظر گرفته شود، لیکن به علت محدودیت منابع میزان  $d$  برابر ۱۰٪ در نظر گرفته شد. با توجه به این‌که هدف از انجام این طرح تخمین آلودگی جهت سیاست‌گذاری‌های بعدی است، لذا ۱۰٪ میزان دقت می‌تواند تخمینی از مشکلات احتمالی موجود به ما ارائه دهد و تغییر خطای قابل‌تحمل از ۵٪± به ۱۰٪± گویای شرایط حاضر می‌باشد. در مورد حجم نمونه برای تخم‌مرغ‌های مورد بررسی نیز بر اساس عدم وجود آمار قبلی از جامعه و با در نظر گرفتن  $n=30$  جهت دستیابی به جامعه با توزیع نرمال و خطای احتمالی در انجام آزمایش حجم نمونه برابر ۳۰+۵ تعیین گردید.

**- نمونه‌گیری**

نمونه‌های گوشت طیور به میزان حدود ۱۰۰ گرم توسط اسکالپل در کیسه‌های استریل جمع‌آوری گردید و در دمای ۲۰- درجه سانتی‌گراد قرار داده شدند. نمونه‌های تخم‌مرغ جمع‌آوری‌شده در شانه‌های مقوایی در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد به آزمایشگاه منتقل و ظرف ۷۲ ساعت پس از جمع‌آوری پروسس شدند. تخم‌مرغ‌ها با اتانول ۷۰٪ اسپری و پس از خشک شدن، انتهای پوسته تخم‌مرغ از حفره هوایی با استفاده از قیچی استریل جدا گردید. محتویات تخم‌مرغ در ظروف استریل جمع‌آوری و در داخل فریزر ۲۰- درجه سانتی‌گراد تا زمان انجام آزمایش نگهداری شد.

گوشت طیور در مقایسه با MRL نشان داده شده است. در بین باقی مانده‌های آنتی‌بیوتیک‌های مورد مطالعه تنها ۴ نمونه (۱۱/۴۳ درصد) از گوشت طیور دارای مقادیر بالاتر از MRL فلوروکینولون می‌باشند. ضمناً با توجه به این‌که حداکثر سطح باقی مانده برای داروهای مورد مصرف در دام و طیور در ایران تعریف نشده است، در این مطالعه از MRL توصیه شده توسط اتحادیه اروپا (EU) استفاده شده است.


۲۴ و ۲۰ و در سولفونامیدها در هر دو نمونه در عدد ۲۰ ضرب گردید.

#### - روش تجزیه و تحلیل داده‌ها


مقادیر باقی مانده‌های آنتی‌بیوتیک‌های فلوروکینولون، تتراسایکلین و سولفونامید به دست آمده از تست الیزا در گوشت طیور و تخم مرغ به صورت میانگین  $\pm$  خطای استاندارد با استفاده از آزمون آنالیز واریانس توسط نرم افزار SPSS مورد ارزیابی قرار گرفت. اختلاف آماری در سطح  $p < 0/05$  معنی دار قلمداد می‌شود.

#### یافته‌ها


در نمودارهای (۱)، (۲) و (۳) به ترتیب میزان باقی مانده فلوروکینولون، تتراسایکلین و سولفونامید در



نمودار (۱) - میزان باقی مانده فلوروکینولون در نمونه‌های گوشت طیور مصرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با MRL (۱۰۰ نانوگرم در هر گرم)



نمودار (۲)- میزان باقی‌مانده تتراسایکلین در نمونه‌های گوشت طیور مصرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با MRL (۱۰۰ نانوگرم در هر گرم)



نمودار (۳)- میزان باقی‌مانده سولفونامید در نمونه‌های گوشت طیور مصرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با MRL (۱۰۰ نانوگرم در هر گرم)

مقایسه میانگین باقی‌مانده‌های فلوروکینولون، تتراسایکلین و سولفونامید در نمونه‌های گوشت طیور در سطح ۰/۰۵ معنی‌دار می‌باشد. (۱) نشان داده‌شده است. در این مطالعه، تفاوت میانگین

جدول (۱) - مقایسه میانگین غلظت باقی مانده های فلوروکینولون، تتراسایکلین و سولفونامید در نمونه های گوشت طیور (نانوگرم/گرم) مصرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران

آنتی بیوتیک	تعداد نمونه ها	تعداد (درصد) نمونه های دارای باقیمانده	میانگین باقیمانده آنتی بیوتیک $\pm$ خطای استاندارد	تعداد (درصد) نمونه های بالاتر از MRL در کل نمونه ها
فلوروکینولون	۳۵	۳۵ (۱۰۰)	$۷۲/۵۹ \pm ۴/۳۰^a$	۱۱/۴۳
تتراسایکلین	۳۵	۳۰ (۸۵/۷۱)	$۱۵/۳۵ \pm ۱/۶^b$	صفر
سولفونامید	۳۵	۲۸ (۸۰/۰۰)	$۳۶/۵۲ \pm ۳/۶۱^c$	صفر

a, b و c حروف متفاوت نشان دهنده تفاوت معنی دار بین باقی مانده های فلوروکینولون، تتراسایکلین و سولفونامید در گوشت طیور می باشد.

مقایسه میانگین باقی مانده های فلوروکینولون، تتراسایکلین و سولفونامید در نمونه های تخم مرغ در جدول (۲) نشان داده شده است. در این مطالعه، تفاوت میانگین باقی مانده های فلوروکینولون، تتراسایکلین و سولفونامید در نمونه های تخم مرغ در این مطالعه، تفاوت میانگین باقی مانده های فلوروکینولون بودند که استفاده از این آنتی بیوتیک ها در طیور تخم گذار منع مصرف دارد.

جدول (۲) - مقایسه میانگین غلظت باقی مانده های فلوروکینولون، تتراسایکلین و سولفونامید در تخم مرغ (نانوگرم/گرم) مصرفی ارتش جمهوری اسلامی

آنتی بیوتیک	تعداد نمونه ها	تعداد و درصد نمونه های دارای باقی مانده	میانگین باقی مانده آنتی بیوتیک $\pm$ خطای استاندارد	تعداد و درصد نمونه های بالاتر از MRL در کل نمونه ها
فلوروکینولون	۳۵	۴ (۱۱/۴۳)	$۱/۲۳ \pm ۰/۶^a$	۱۱/۴۳
تتراسایکلین	۳۵	۸ (۲۲/۸۵)	$۲/۸۴ \pm ۰/۹۴^b$	صفر
سولفونامید	۳۵	صفر	صفر <sup>c</sup>	صفر

a, b و c حروف متفاوت نشان دهنده تفاوت معنی دار بین باقی مانده های فلوروکینولون، تتراسایکلین و سولفونامید در تخم مرغ می باشد.

## بحث و نتیجه گیری

مصرف در دام و طیور مشخص نشده است که لازم است هر چه سریع تر سازمان های رسمی نسبت به این امر مهم مبادرت ورزند. چندین سازمان مانند FAO، WHO، EU و FDA تالرانس و یا MRL داروهای مورد مطالعه را تعیین کرده اند (Al-Ghamdi et al., 2000). در این مطالعه از میزان MRL توصیه شده براساس EU استفاده گردید که میزان مجاز هر سه آنتی بیوتیک مورد مطالعه در گوشت مرغ ۱۰۰ میکروگرم

بروز باقی مانده های آنتی بیوتیک که عمدتاً به منظور درمان و یا پیشگیری از بیماری در دام و طیور مورد استفاده قرار می گیرد، یکی از نگرانی های جدید در حوزه بهداشت عمومی است، لذا تعیین MRL با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی برای هر کشوری لازم و ضروری بوده و متأسفانه در کشور ایران هنوز برای داروهای دامپزشکی از جمله آنتی بیوتیک های مورد

در هر کیلوگرم می‌باشد. در رابطه با تخم‌مرغ، میزان MRL برای آنتی‌بیوتیک‌های رده فلوروکینولون و سولفونامید مشخص نشده است که دلیل آن منع مصرف این آنتی‌بیوتیک‌ها در مرغان تخم‌گذار می‌باشد. میزان MRL برای تتراسایکلین در تخم‌مرغ براساس EU، ۲۰۰ میکروگرم در هر کیلوگرم می‌باشد (European Commission, 2010).

در مطالعه حاضر، میزان آلودگی آنتی‌بیوتیک‌های فلوروکینولون، تتراسایکلین و سولفونامید در گوشت مرغ به ترتیب ۱۰۰٪، ۸۵/۷۱٪ و ۸۰/۰۰٪ تشخیص داده شد. در تمام نمونه‌ها، تنها ۴ نمونه (۱۱/۴۲٪) سطوح بالاتر از MRL داشتند که مربوط به باقی‌مانده فلوروکینولون بود. چندین طرح در ایران با روش‌های چهار محیط کشت و کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا جهت اندازه‌گیری باقی‌مانده آنتی‌بیوتیک‌ها در بافت‌های مختلف مرغ انجام شده است. در مطالعه‌ای (Salehzadeh et al., 2007) نشان داده شد که تمام نمونه‌های مورد آزمایش دارای باقی‌مانده انروفلوکسازین می‌باشند که از بین آن‌ها تعداد ۲۲ نمونه (۲۴/۴۴٪) دارای باقی‌مانده بالاتر از MRL بودند که در ۸ (۸/۸٪)، ۱۲ (۱۳/۳۳٪) و ۲۲ (۲۴/۴۴٪) عدد از نمونه‌ها که به ترتیب از عضله، کبد و کلیه گرفته شده بود، باقی‌مانده انروفلوکسازین بالاتر از MRL مشاهده گردید. لازم به ذکر است که مطالعه ذکر شده، از MRL تعیین شده توسط کشورهای مالزی و عربستان سعودی که ۳۰ میکروگرم در هر کیلوگرم بود، استفاده گردید؛ اما باین حال ۲ نمونه (۲/۲۲٪) از نمونه‌های گوشت طیور دارای باقی‌مانده فلوروکینولون بیش از MRL تعیین شده

توسط EU (۱۰۰ میکروگرم در هر کیلوگرم) بود. میانگین غلظت انروفلوکسازین در ماهیچه، کبد و کلیه به ترتیب ۱۸/۳۲±۳۲/۲۹، ۱۸/۳۴±۱۲/۳۶ و ۲۶/۰۶±۱۹/۵۲ نانوگرم در هر گرم بود. این مطالعه تأییدکننده استفاده سوء و گسترده از انروفلوکسازین در مزارع و نبود نظارت بر مدت‌زمان محرومیت می‌باشد. در مطالعه دیگر که بر روی بافت‌های عضله، کبد و کلیه ۱۶۰ لاشه طیور گوشتی از استان‌های شمال غرب ایران انجام گردید (Tajik et al., 2011)، جهت تعیین میزان باقی‌مانده انروفلوکسازین ابتدا توسط روش میکروبیولوژی چهار محیط کشت، غربال‌گری گردید، سپس نمونه‌های مثبت برای تعیین میزان انروفلوکسازین برای انجام آزمایش الایزا ارجاع گردید. براساس نتایج حاصله از این روش، ۲۸ لاشه از مجموع ۱۶۰ لاشه مورد بررسی، واجد باقی‌مانده انروفلوکسازین بودند. تست الایزا نشان داد که به ترتیب ۲۵، ۸۵/۷۱ و ۱۴/۲۸ درصد نمونه‌های کلیه، کبد و عضله واجد باقی‌مانده انروفلوکسازین بالاتر از حد مجاز MRL تعریف شده (بر اساس استاندارد EU) برای این آنتی‌بیوتیک در نمونه‌های طیور بودند. در هر دو مطالعه ذکر شده، بیشترین میزان باقی‌مانده‌ها در کبد و کلیه تشخیص داده شد که علت پایین بودن میزان باقی‌مانده‌ها در مورد نمونه‌های عضله، ناشی از انتشار ضعیف و حذف سریع این آنتی‌بیوتیک در این بافت می‌باشد. با توجه به این نکته که کبد و کلیه به‌عنوان ارگان‌های ترشحی، محل تجمع و متابولیزاسیون ترکیبات دارویی می‌باشند؛ بنابراین بالا بودن میزان باقی‌مانده‌های دارویی در این دو ارگان دور از ذهن نیست (Rao et al., 2001). در



۲۰ نمونه مرغ و ۱۰ نمونه بوقلمون مشاهده شد. دامنه سطوح فلوروکینولون از ۲۰/۹ تا ۱۱۴/۲ میکروگرم در هر کیلوگرم از نمونه‌های مرغی و از ۳۶/۵ تا ۸۷/۶ میکروگرم در هر کیلوگرم از نمونه‌های بوقلمون متغیر بود. تنها یک نمونه مثبت گوشت مرغ دارای سطوح بالاتر از MRL بود (Pena et al., 2010). نمونه‌ای از وضعیت کشورهای توسعه‌یافته توسط مطالعه‌ای (Weiss et al., 2007) در ایتالیا در سال ۲۰۰۷ بیانگر این بود که سطح آلودگی در گوشت طیور ایتالیا ۰/۳۳٪ و فراوانی باقی‌مانده آنتی‌بیوتیکی در دوره هفت‌ساله از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ کمتر از ۰/۵٪ بود که نشان‌دهنده این است که برنامه‌های پایش باقی‌مانده‌های آنتی‌بیوتیکی در حفاظت از مصرف‌کننده مؤثر می‌باشد. این نرخ آلودگی در نمونه‌های مرغ در مقایسه با درصد وقوع آلودگی در مطالعه حاضر بسیار کمتر بود. کینولون‌ها ممانعت‌کننده‌های قوی آنزیم DNA جیراز می‌باشند که این آنزیم برای تکثیر DNA و رونویسی مهم و حیاتی است. مسمومیت و اثرات سوء این آنتی‌بیوتیک‌ها در حیوانات و انسان به‌خوبی تعیین شده است. فلوروکینولون‌ها توانایی تخریب مفاصل نوجوانان، کلیه، چشم و سیستم اعصاب مرکزی را دارد (Patterson, 1991). با توجه به اثرات مخرب فلوروکینولون‌ها بر روی سلامتی انسان، باقی‌مانده‌ها در مواد غذایی و سایر منابع محیطی سلامتی انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین آنالیز این داروها در بافت‌های خوراکی دام و طیور در سلامتی انسان بسیار قابل اهمیت می‌باشد.

مطالعه‌ای که در عربستان سعودی انجام شد، نورفلوکساسین در ۳۵٪ ماهیچه و ۵۶/۷٪ کبد طیور تشخیص داده شد. دامنه میانگین غلظت نورفلوکساسین در ماهیچه و کبد به ترتیب ۱۰۰۰-۸۰ میکروگرم در هر کیلوگرم و ۱۰۳۰-۱۱۰ میکروگرم در هر کیلوگرم بود که ۲/۷-۳۴/۳ برابر بالاتر از MRL (۳۰ میکروگرم در هر کیلوگرم) بود که نشان‌دهنده ریسک بالا برای مصرف‌کننده‌ها می‌باشد (Al-Mustafa and Al-Ghamdi, 2000). در پژوهش انجام‌شده در ترکیه (Er et al., 2013)، ۱۲۷ نمونه گوشت مرغ را تحت بررسی باقی‌مانده فلوروکینولون از طریق الیزا قراردادند. ۵۸ (۴۵/۷٪) نمونه از نمونه‌های گوشت مرغ دارای باقی‌مانده فلوروکینولون با میانگین  $30/81 \pm 0/45$  میکروگرم در هر کیلوگرم بودند. این مطالعه نشان داد که میانگین غلظت نمونه‌های گوشت مرغ دارای میزان فلوروکینولون بالاتر از ۱۰۰ میکروگرم در هر کیلوگرم نیستند که بیشترین میزان قابل قبول MRL اتحادیه اروپا می‌باشد. تنها در دو نمونه، سطوح فلوروکینولون بیش از ۱۰۰ میکروگرم در هر کیلوگرم تشخیص داده شد (Er et al., 2013). در مطالعه‌ای در کشور پرتغال (Pena et al., 2010)، حضور باقی‌مانده‌های انروفلوکساسین، سیپروفلوکساسین، نورفلوکساسین و سارافلوکساسین در ۶۱ نمونه عضله مرغ و ۳۷ نمونه بوقلمون با استفاده از کروماتوگرافی مایع ارزیابی شد. در این مطالعه از ۹۸ نمونه طیور نمونه‌برداری شده ۴۱ نمونه (۴۱/۸٪) دارای سطوح باقی‌مانده فلوروکینولون بودند؛ آلودگی در ۴۴/۲٪ گوشت مرغ و ۳۷/۸٪ گوشت بوقلمون تشخیص داده شد. حضور انروفلوکساسین در

پژوهشی در عربستان (Al-Ghamdi *et al.*, 2000) باقی‌مانده تتراسایکلین را در ۶۹/۷٪ فارم‌های مورد مطالعه مثبت گزارش کردند که از این تعداد ۸۲/۶٪ دارای باقی‌مانده تتراسایکلین بیش از MRL مجاز (۰/۱ µg/g) بودند. داروهای اکسی‌تتراسایکلین و کلر تتراسایکلین برای مقاصد درمانی و پروفیلاکسی تأیید شده است و تتراسایکلین و داکسی‌سایکلین تنها برای موارد درمانی طیور استفاده می‌شود. در مطالعه حاضر و سایر مطالعات ذکر شده در بالا نشان داده شده است که رده تتراسایکلین‌ها در طول سیکل تولید به‌طور مداوم استفاده می‌شود (Salehzadeh *et al.*, 2006; Shahid *et al.*, 2007; Al-Ghamdi *et al.*, 2000)؛ بنابراین، این روش ممکن است به‌طور قابل توجهی منجر به ایجاد مقاومت میکروبی گردد. اکثر گزارشات نشان‌دهنده این است که مقاومت میکروبی به آنتی‌بیوتیک ممکن است در نتیجه در معرض قرارگیری حیوان به مواد ضد میکروبی با احتمال انتقال مقاومت به پاتوژن‌های انسانی صورت گیرد. علاوه‌براین، در معرض قرارگیری انسان به محصولات دامی و طیور دارای سطوح بالای آنتی‌بیوتیک، ممکن است سبب پاسخ ایمنولوژیک در افراد حساس گردد و اختلالاتی را در فلور دستگاه گوارش ایجاد کند (Salama *et al.*, 2011).

بر پایه نتایج به‌دست‌آمده از مطالعه حاضر از بین ۳۵ نمونه گوشت مرغ، ۲۸ (۸۰ درصد) نمونه دارای باقی‌مانده سولفونامید بودند. تمام نمونه‌های مثبت مورد آزمایش مقادیر کمتر از MRL را داشتند. میانگین باقی‌مانده سولفونامید ۳۶/۵۲ میکروگرم در کیلوگرم

مطالعه حال حاضر نشان داد که ۳۰ نمونه (۸۵/۷۱٪) از نمونه‌های گوشت مرغ دارای باقی‌مانده تتراسایکلین بودند و هیچ نمونه واجد مقادیر بالاتر از MRL (۱۰۰ میکروگرم در هر کیلوگرم) یافت نشد. در بررسی صورت‌گرفته بر روی ۲۷۰ نمونه گوشت مرغ، کبد و کلیه (Salehzadeh *et al.*, 2006)، تمام نمونه‌ها دارای باقی‌مانده اکسی‌تتراسایکلین بودند که ۲۵ (۲۷/۷۷٪)، ۸۶ (۹۵/۵۵٪) و ۱۷ (۱۸/۸۸٪) نمونه به ترتیب از نمونه‌های عضله، کبد و کلیه دارای مقادیر بالاتر از MRL گزارش شدند. میانگین غلظت اکسی‌تتراسایکلین در عضله، کبد و کلیه  $44/503 \pm$  ۸۸/۲۱۷  $201/908 \pm$  ۵۷۶/۶۵۷ و  $186/64 \pm$  ۵۱۷/۵۶ میکروگرم در هر کیلوگرم بود. این میانگین غلظت بیش از میانگین غلظت (۱۵/۳۵±۱/۶) میکروگرم در هر کیلوگرم) نمونه‌های بررسی شده در این مطالعه می‌باشد. شیوع کمتر باقی‌مانده تتراسایکلین به نسبت رده فلوروکینولون‌ها، ممکن است مرتبط با استفاده از سایر ضد میکروب‌های در دسترس که دارای طیف وسیع‌تر می‌باشند، باشد. نتایج مطالعه‌ای در مصر (Salama *et al.*, 2011) نشان داد که ۶۶ نمونه (۴۴٪) از ۱۵۰ نمونه مورد مطالعه دارای باقی‌مانده تتراسایکلین هستند که شامل ۲۱ نمونه گوشت سینه مرغ (۴۲٪)، ۱۹ نمونه گوشت ران مرغ (۳۸٪) و ۲۶ نمونه کبد (۵۲٪) بود. از این تعداد، ۱۲ نمونه گوشت سینه مرغ (۸٪)، ۱۳ نمونه گوشت ران مرغ (۷/۳۳٪) و ۲۰ نمونه کبد (۱۳/۳۳٪) واجد باقی‌مانده تتراسایکلین بیش از MRL (۲۰۰ میکروگرم در هر کیلوگرم برای گوشت مرغ و ۶۰۰ میکروگرم در هر کیلوگرم برای کبد) بودند. طبق

تشخیص داده شد. در حال حاضر هیچ‌گونه گزارشی در رابطه با باقی‌مانده سولفونامیدها در کشور ایران و آسیا برای مقایسه واقع‌بینانه وجود ندارد. تنها یک مطالعه در مالزی (Cheong *et al.*, 2010) انجام شده است که غلظت سولفونامیدها در نمونه‌های گوشت سینه و کبد مرغ به ترتیب ۰/۰۶۲-۰/۰۰۶ و ۰/۱۹۳-۰/۰۸ میکروگرم در هر گرم بود که تقریباً نتایج آن مشابه با نتایج مطالعه حاضر است. مقادیر بالاتر از MRL باقی‌مانده سولفونامید در مطالعه حاضر در مقایسه با سایر کشورهای توسعه‌یافته صفر است. به‌طور مثال در ایالات متحده آمریکا، میزان آلودگی سولفونامیدها بیش از ۰/۴٪ گزارش شده است (Dey *et al.*, 2003)، در حالی که در ایتالیا درصد وقوع بسیار نادر (کمتر از ۱ درصد) گزارش شده است (Weiss *et al.*, 2007). نمونه‌های گوشت طیور مورد مطالعه در ایتالیا آلودگی سولفادiazین را ۰/۲۱-۰/۶۴ میکروگرم در هر کیلوگرم و سولفاکوئینوکسالیین را ۰/۹۸-۱۱۶/۰ میکروگرم در هر کیلوگرم گزارش کرده‌اند. نمونه‌های مثبت در این مطالعات اغلب نمونه‌های کبدی می‌باشد (Weiss *et al.*, 2007).

استفاده از فلوروکینولون‌ها در مرغان تخم‌گذار ممنوع است، زیرا مواد ضد میکروبی ممکن است از طریق تخم‌مرغ به انسان منتقل شود. کینولون‌ها داروهای ضد میکروبی مورد مصرف در طب انسانی و دامپزشکی به‌منظور درمان انواع مختلفی از بیماری‌ها اعم از عفونت‌های ادراری، تنفسی و معده-روده‌ای می‌باشند. در مطالعه حاضر، از بین ۳۵ نمونه تخم‌مرغ، ۴ نمونه (۱۱/۴۳ درصد) دارای باقی‌مانده فلوروکینولون بودند.

دلیل وجود مقادیر کم فلوروکینولون در تخم‌مرغ را می‌توان به عدم رعایت مدت‌زمان محرومیت دارو در مرغان تخم‌گذار اشاره کرد. در بررسی صورت گرفته بر روی ۶۰ نمونه تخم‌مرغ در استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش میکروبیولوژی چهار محیط کشت صورت گرفت، ۱۸ (۳۰٪) مورد دارای باقی‌مانده آنتی‌بیوتیک بود (Hakimzadegan *et al.*, 2014). از این ۱۸ مورد، ۱۱ (۶۱/۱۱٪) مورد دارای باقی‌مانده ماکرولید، ۴ (۲۲/۲۲٪) مورد دارای باقی‌مانده آمینوگلیکوزید و ۳ (۱۶/۶۶٪) مورد دارای باقی‌مانده تتراساسکلین بودند و هیچ‌گونه آلودگی تخم‌مرغ به فلوروکینولون گزارش نشد. مطالعه‌ای در اردن با استفاده از آزمایش Premi® انجام گرفت که ۶۴ (۱۲/۸٪) نمونه از ۵۰۰ تخم‌مرغ از لحاظ باقی‌مانده ضد میکروبی مثبت بودند. باقی‌مانده ضد میکروبی در ۴۷ نمونه (۷۸/۶٪) از سفیده تخم‌مرغ و ۱۷ نمونه (۲۶/۶٪) از زرده تخم‌مرغ تشخیص داده شد. در ۹ نمونه، باقی‌مانده هم در زرده و هم در سفیده وجود داشت. وجود باقی‌مانده کلرتراسایکلین در ۱۴ نمونه (۲۱/۹٪) از ۶۴ نمونه مثبت در آزمایش غربالگری Premi® نشان داده شد. غلظت باقی‌مانده کلرتراسایکلین در ۶ نمونه (۴۲/۹٪) از ۱۴ نمونه مثبت بالاتر از MRL بود. به‌عبارت‌دیگر، تنها ۱/۲٪ از نمونه‌های مورد آزمایش دارای باقی‌مانده کلرتراسایکلین بیش از MRL بودند. باقی‌مانده سولفونامید در ۲۶ نمونه (۴۰/۶٪) از ۶۴ نمونه مثبت در آزمایش غربالگری Premi® تشخیص داده شد. غلظت باقی‌مانده سولفونامید در ۲۰ نمونه (۷۶/۹٪) از ۲۶ نمونه مثبت به سولفونامید بیش از MRL توصیه‌شده بود که

به مدت زمان پرهیز از مصرف باشد. راهنمایی نامناسب برچسب دارو توسط سازنده و در دسترس بودن داروهای ژنریک متعدد همراه با استفاده‌های سوء، از عوامل اصلی باقی‌مانده‌ها در محصولات دامی و طیور می‌باشد (Ezenduka *et al.*, 2011).

ارزیابی و تعیین میزان باقی‌مانده آنتی‌بیوتیک در نمونه‌های غذاهای مصرفی انسان می‌تواند گام ارزشمندی در جهت سلامتی و بهداشت عمومی باشد و با پیشگیری از بیماری‌ها در دام و طیور و همچنین کاهش مصرف داروهای آنتی‌بیوتیک، می‌توان وقوع مقاومت دارویی در انسان را به حداقل رساند. با توجه به این‌که نمونه‌های مورد بررسی بخشی از جامعه گوشت مرغ و تخم‌مرغ کشور است، مطالعه حاضر بیانگر استفاده نادرست از آنتی‌بیوتیک‌ها توسط تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ می‌باشد که ناشی از فقدان نظارت کافی توسط سازمان‌های ذی‌ربط در این حوزه می‌باشد. بنابراین مطالعات بعدی برای ارزیابی سایر باقی‌مانده‌های دارویی در نمونه‌های مرغ و تخم‌مرغ و نیز پایش دائمی محصولات پروتئینی برای احراز سلامتی آن برای مصرف انسان ضروری می‌باشد.

### تعارض منافع

نویسندگان هیچ‌گونه تعارض منافی برای اعلام ندارند.

بیانگر ۴٪ از کل تخم‌مرغ‌های مورد آزمایش می‌باشد. میانگین غلظت باقی‌مانده سولفونامید در سفیده و زرده تخم‌مرغ به ترتیب ۴۴۳/۹ و ۴۱۴/۵ میکروگرم در هر گرم بود. این غلظت متجاوز از MRL (۱۰۰ میکروگرم در هر کیلوگرم) پیشنهادی EU می‌باشد. در مطالعه حاضر نشان داده شد که ۱۱/۴۳ درصد از نمونه‌های تخم‌مرغ دارای باقی‌مانده انروفلوکساسین و ۲۲/۸۵ درصد دارای باقی‌مانده تتراسایکلین بود. این میزان ممکن است نمایانگر سوء مصرف داروهای دامپزشکی در صنعت طیور تخم‌گذار باشد. این میزان بسیار بالاتر از کشورهای توسعه‌یافته مانند کانادا (۱٪) و تقریباً مشابه کشورهای در حال توسعه مانند عربستان سعودی (۱۴/۱٪) (Al-Ghamdi *et al.*, 2000) و نیجریه (۳۶٪) (Ezenduka *et al.*, 2011) می‌باشد. این مطالعه تأییدکننده حضور دو باقی‌مانده فلوروکینولون و تتراسایکلین در تخم‌مرغ‌های مصرفی ارتش بود؛ در حالی که شیوع باقی‌مانده سولفونامید در تخم‌مرغ‌های مورد مطالعه صفر بود. میزان شیوع صفر سولفونامیدها ممکن است مرتبط با استفاده از سایر ضد میکروب‌های در دسترس باشد که دارای طیف وسیع‌تر و نسبتاً ارزان‌تر از سولفونامیدها می‌باشند. دلایل احتمالی برای شیوع بالای وجود باقی‌مانده‌های آنتی‌بیوتیکی در تخم‌مرغ، ممکن است به دلیل فقدان در کنترل مصرف داروهای دامپزشکی، استفاده از دارو بدون در نظر گرفتن موارد ذکر شده در برچسب دارویی و عدم توجه

## منابع

- Alaboudi, A., Abu Basha, E. and Musallam, I. (2013). Chlortetracycline and sulfanilamide residues in table eggs: Prevalence, distribution between yolk and white and effect of refrigeration and heat treatment. *Food Control*, 33(1): 281-286.
- Alghamdi, M. S., Almस्ताفا, Z. H., Elmorsy, F., Alfaky, A., Haider, I. and Essa, H. (2000). Residues of tetracycline compounds in poultry products in the eastern province of Saudi Arabia. *Public Health*, 114(4): 300-304.
- Almस्ताفا, Z. H. and Alghamdi, M. S. (2000). Use of norfloxacin in poultry production in the eastern province of Saudi Arabia and its possible impact on public health. *International Journal of Environmental Health Research*, 10(4): 291-299.
- Carlet, J., Jarlier, V., Harbarth, S., Voss, A., Goossens, H. and Pittet, D. (2012). Ready for a world without antibiotics? The Pensières Antibiotic Resistance Call to Action. *Antimicrobial Resistance and Infection Control*, 1(1): 11.
- Cheong, C. K., Hajeb, P., Jinap, S. and Ismail-Fitry, M. R. (2010). Sulfonamides determination in chicken meat products from Malaysia. *International Food Research Journal*, 17: 885-892.
- Dewdney, J. M., Maes, L., Raynaud, J. P., Blanc, F., Scheid, J. P., Jackson, T., Lens, S. and Verschueren, C. (1991). Risk assessment of antibiotic residues of beta-lactams and macrolides in food products with regard to their immuno-allergic potential. *Food and Chemical Toxicology*, 29(7): 477-83.
- Dey, B. P., Thaler, A. and Gwozdz, F. (2003). Analysis of microbiological screen test data for antimicrobial residues in food animals. *Journal of Environmental Science and Health, Part B: Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes*, 38(3): 391-404.
- Donoghue, D. J. (2003). Antibiotic residues in poultry tissues and eggs: human health concerns? *Poultry Science*, 82(4): 618-621.
- Er, B., Onurdag, F. K., Demirhan, B., Ozgacar, S. O., Oktem, A. B. and Abbasoglu, U. (2013). Screening of quinolone antibiotic residues in chicken meat and beef sold in the markets of Ankara, Turkey. *Poultry Science*, 92(8): 2212-2215.
- European Commission 2010. Commission Regulation (EU) No 37/2010 of 22 December 2009 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin. *Official Journal of the European Union*, 53.
- Ezenduka, E. V., Oboegbulem, S. I., Nwanta, J. A. and Onunkwo, J. I. (2011). Prevalence of antimicrobial residues in raw table eggs from farms and retail outlets in Enugu State, Nigeria. *Tropical Animal Health and Production*, 43(3): 557-559.
- Gustafson, R. H. (1993). Historical perspectives on regulatory issues of antimicrobial resistance. *Veterinary and Human Toxicology*, 35(Suppl 1): 2-5.
- Hakimzadegan, M., Khalilzadeh Khosroshahi, M. and Hasseini Nasab, S. (2014). Monitoring of Antibiotic Residue in chicken eggs in Tabriz city by FPT. *International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research*, 2(1): 132-140.
- Madadi, M., Bojmehrani, H. and Azari, M. 2014. Evaluation of drug interactions and prescription errors of poultry veterinarians in north of Iran. *Poultry Science Journal*, 2(1): 25-35.
- Moreno-Bondi, M. C., Marazuela, M. D., Herranz, S. and Rodriguez, E. (2009). An overview of sample preparation procedures for LC-MS multiclass antibiotic determination in environmental and food samples. *Analytical and Bioanalytical Chemistry*, 395(4): 921-946.
- Myllyniemi, A. L., Rannikko, R., Lindfors, E., Niemi, A. and Backman, C. (2000). Microbiological and chemical detection of incurred penicillin G, oxytetracycline, enrofloxacin and ciprofloxacin residues in bovine and porcine tissues. *Food Additives and Contaminants*, 17(12): 991-1000.

- Paige, J. C., Tollefson, L. and Miller, M. (1997). Public health impact on drug residues in animal tissues. *Veterinary and Human Toxicology*, 39(3): 162-169.
- Patterson, D. R. (1991). Quinolone toxicity: methods of assessment. *The American Journal of Medicine*, 91(6A): 35S-37S.
- Pena, A., Silva, L. J., Pereira, A., Meisel, L. and Lino, C. M. (2010). Determination of fluoroquinolone residues in poultry muscle in Portugal. *Analytical and Bioanalytical Chemistry*, 397(6): 2615-2621.
- Raison-Peyron, N., Messaad, D., Bousquet, J. and Demoly, P. (2001). Anaphylaxis to beef in penicillin-allergic patient. *Allergy*, 56(8): 796-797.
- Rao, G. S., Ramesh, S., Ahmad, A. H., Tripathi, H. C., Sharma, L. D. and Malik, J. K. (2001). Pharmacokinetics of enrofloxacin and its metabolite ciprofloxacin after intramuscular administration of enrofloxacin in goats. *Veterinary Research Communications*, 25(3): 197-204.
- Salama, N. A., Abou-Raya, S. H., Shalaby, A. R., Emam, W. H. and Mehaya, F. M. (2011). Incidence of tetracycline residues in chicken meat and liver retailed to consumers. *Food Additives and Contaminants: Part B: Surveillance*, 4(2): 88-93.
- Salehzadeh, A., Madadi, M., Salehzadeh, A., Rokni, N. and Golchinefar, F. (2006). Oxytetracycline Residue in Chicken Tissues from Tehran Slaughterhouses in Iran. *Pakistan Journal of Nutrition*, 5(4): 377-381.
- Salehzadeh, F., Salehzadeh, A., Rokni, N., Madani, R. and Golchinefar, F. (2007). Enrofloxacin Residue in Chicken Tissues from Tehran Slaughterhouses in Iran. *Pakistan Journal of Nutrition*, 6(4): 409-413.
- Samadpour, M., Stewart, J., Steingart, K., Addy, C., Louderback, J., McGinn, M., Ellington, J. and Newman, T. (2002). Laboratory investigation of an E. coli O157:H7 outbreak associated with swimming in Battle Ground Lake, Vancouver, Washington. *Journal of Environmental Health*, 64(10): 16-20, 26, 25.
- Schwartz, H. J. and Sher, T. H. (1984). Anaphylaxis to penicillin in a frozen dinner. *Annals of Allergy*, 52(5): 342-3.
- Shahid, M. A., Siddique, M., Abubakar, M., Arshed, M. J., Asif, M. and Ahmad, M. (2007). Status of oxytetracycline residues in chicken meat in Rawalpindi/Islamabad area of Pakistan. *Asian Journal of Poultry Science*, 1, 8-15.
- Sundlof, S. F. (1994). Human Health Risks Associated with Drug Residues in Animal-Derived Foods. *Journal of Agromedicine*, 1(2): 5-20.
- Tajik, H., Razavi Rouhani, S., Pajohi Alamoti, M. and Mahmoudi R. (2011). Comparison of enrofloxacin residues in poultry tissues slaughtered in North West provinces of Iran by using FPT and ELISA. *Urmia Medical Journal*. 22(1): 18-24 [In Persian].
- Weiss, C., Conte, A., Milandri, C., Scortichini, G., Semprini, P., Usberti, R. and Migliorati, G. (2007). Veterinary drugs residue monitoring in Italian poultry: Current strategies and possible developments. *Food Control*, 18(9): 1068-1076.

## Antibiotic residues in chicken meat and table eggs consumed in Islamic Republic of Iran Army

Dabagh Moghadam, A.<sup>1</sup>, Bashashati, M.<sup>2\*</sup>, Hosseini-Shokouh, S.J.<sup>3</sup>, Hashemi, S.R.<sup>4</sup>

1. Department of Health and Social Medicine, AJA University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2. AJA University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3. Infectious Diseases Research Center, AJA University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4. Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, Karaj Azad University, Karaj, Iran

Corresponding Author: mohsen.bashashati@gmail.com

(Received: 2014/12/19 Accepted: 2017/5/22)

### Abstract

Widespread use of antibiotic may cause residuals in food stuffs, as well as the induction of allergic reactions in humans. In addition, resistance to pathogenic bacteria has been constantly weakening as a result of antibiotic use. The objectives of this study were to evaluate the presence of common three groups of antibiotics including fluoroquinolone, tetracycline and sulfonamide in chicken meat and table eggs consumed in Islamic Republic of Iran Army (IRIA). A total of 70 poultry samples, including chicken meat and eggs from IRIA's cold storages, were analyzed using ELISA for determination of antibiotic residues. Of the chicken samples analyzed, 35 (100%), 30 (85.71%) and 28 (80.00%) were contaminated with fluoroquinolone, tetracycline and sulfonamide, respectively. The mean levels ( $\pm$ SE) of fluoroquinolone, tetracycline and sulfonamide were found to be  $72.59 \pm 4.30$   $\mu$ g/kg,  $15.35 \pm 1.6$   $\mu$ g/kg and  $36.52 \pm 3.61$   $\mu$ g/kg in chicken samples, respectively. 4 (11.43%) of chicken samples exceeded the maximum residue level (MRL). The study revealed that 4 (11.43%), 8 (22.85%) and zero of 35 egg samples were positive for fluoroquinolone, tetracycline and sulfonamide, respectively. The mean levels ( $\pm$ SE) of fluoroquinolone, tetracycline and sulfonamide were found to be  $1.23 \pm 0.6$   $\mu$ g/kg,  $2.84 \pm 0.94$   $\mu$ g/kg and zero  $\mu$ g/kg in egg samples, respectively. This study indicated that some consumable chicken meat and eggs of IRIA contain residues of antibiotics, therefore, it is necessary to monitor protein products regarding to antimicrobial residues for public health.

**Conflict of Interest:** None declared.

**Keywords:** Antibiotic residue, ELISA, MRL, Chicken meat, Egg